



## Antibiótico - Profilaxia Cirúrgica

<b>CIRURGIA</b>	<b>ANTIBIÓTICO 1ª OPÇÃO</b>	<b>DOSE</b>	<b>DURAÇÃO</b>	<b>ALTERNATIVAS (alergias)</b>
<b>Cardíaca</b>	Cefazolina	2g durante extra-corpórea após 1g de 8/8 hs	48 horas	Vancomicina (1g de 12/12 hs ou 500mg de 6/6 hs)
<b>Vascular</b>	Cefazolina	1 g	24 hs (8/8 hs)	Clindamicina (600mg)
<b>Neurocirurgia</b>	Cefazolina	1 g	24 hs (8/8 hs) ou 48 hs em caso de prótese	Clindamicina (600mg)
<b>Cirurgia torácica</b>	Cefazolina	1 g	24 hs (8/8 hs)	Clindamicina (600mg)
<b>Cirurgia ortopédica</b>	Cefazolina	1 g	24 hs (8/8 hs)	Clindamicina (600mg)
<b>Esôfago-Gastro- duodenal</b>	Cefazolina	1 g	24 hs (8/8 hs)	Clindamicina (600mg) + Gentamicina (3mg/kg)
<b>Cirurgia Vias Biliares</b>	Cefazolina	1 g	24 hs (8/8 hs)	Clindamicina (600mg) + Gentamicina (3mg/kg)
<b>Colorectal de Urgência (incluindo apendicectomia)</b>	Gentamicina + Metronidazol	80mg de 8/8hs e 500mg de 8/8 hs	Até o doente estar alimentando, no máximo 48 hs	Ceftriaxona 1g de 12/12 hs
<b>Colorectal eletiva</b>	Preparo mecânico com neomicina e metronidazol	1g de 6/6hs e 400mg de 8/8 hs	Iniciado 18 hs antes do procedimento até 6 hs antes	Gentamicina + Metronidazol
<b>Trauma Abdominal</b>	Gentamicina + Metronidazol	80mg de 8/8hs e 500mg de 8/8 hs	24 horas	Ceftriaxona 1g de 12/12 hs
<b>Cabeça e Pescoço</b>	Cefazolina	1 g	24 hs (8/8 hs)	Clindamicina (600mg)
<b>Cirurgia Urológica</b>	Cefazolina + Gentamicina	1g 3mg/kg	24 h (8/8h) dose única	Ceftriaxona (1g de 12/12 h por 24 horas)
<b>Próstata (incluindo biópsia) e procedimentos que mantém SVD</b>	Ciprofloxacina + Norfloxacina	200mg 400mg (12/12h)	24 hs (8/8 hs) Até retirada da SVD	Gentamicina (3mg/kg) dose única
<b>Ginecologia- Obstetrícia</b>	Cefazolina	2 g na ligadura do cordão umbilical e após 1g de 8/8 hs	24 hs	Clindamicina (600mg)

**Obs:** Em cirurgias com duração superior a 3 horas, ou em caso de sangramento importante com reposição volêmica superior a 1 litro, deve-se repetir 1g de cefazolina.