



## Controle de Vetores em Ambiente Hospitalar:

**Competência:** Toda equipe de saúde do Hospital Escola da UFTM e profissionais habilitados para a realização da desinsetização e desratização.

### 1- Medidas gerais recomendadas:

**Barata:** Utilizar ralos de esgoto e caixas de gordura sinfonadas, produtos químicos e limpeza adequada.

**Moscas:** Utilizar telas nas áreas de risco como lactário, refeitório, serviço de nutrição e dietética, bloco cirúrgico e central material esterilizado. Acondicionamento adequado do lixo e envenenamento das larvas.

**Ratos:** Impedir condições de sobrevivência removendo entulhos, acondicionando o lixo e os alimentos adequadamente, mantendo o ambiente limpo.

- i. Inspeccionar no mínimo a cada seis meses em todo o hospital, e a cada três meses nas áreas de riscos: serviço de nutrição e dietética, lactário, centro cirúrgico, unidades de terapia intensiva (adulto, coronária e pediatria) e enfermarias. Poderá haver a necessidade de visitar em prazos menores.
- ii. Encaminhar à SCIH o relatório com descrição dos produtos químicos utilizados e locais visitados.
- iii. A limpeza e desinfecção das caixas d'água são realizadas semestralmente de acordo com a legislação vigente.
- iv. A limpeza e desinfecção das caixas d'água são realizadas semestralmente de acordo com a legislação vigente.

\* Formulário com controle roedores e insetos

### 2- Medidas recomendadas em áreas específicas:

#### 2.1- Serviço de nutrição e dietética:

- Área de recepção – Deve ser limpa e livre de resíduos
- Observar condições de conservação dos alimentos.
- Despensa – Prateleiras afastadas da parede, facilitando a limpeza local.
- Janelas – Ventilação adequada e presença de tela.
- Área de preparo de alimentos – Deve ser bem ventilada, limpa e com adequado estado de conservação das paredes, azulejos, bancadas e instalações hidráulicas.

**2.2- Lactário:** deverá seguir as mesmas recomendações.

**2.3- Centro cirúrgico, CTI e enfermarias:**

Manter vedados os ralos e caixas de esgoto.

- **CCIH** - realiza visitas regulares e educa continuamente os funcionários/equipe multidisciplinar do setor e pacientes.  
Manter limpas essas áreas.

**Cuidado a ser observado:**

Lixeira: Devem ter tampas, saco plástico identificado em quantidade suficiente e localização estratégica.

Recolher o lixo antes que sua capacidade total seja alcançada.

**CRONOGRAMA DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO:**

Mês Ano:	Unidades críticas e não críticas
<b>Janeiro</b>	Raio X – Pronto Socorro Adulto e Infantil – UTR
<b>Fevereiro</b>	Lactário – Neuro – Ortopedia – CTI Adulto – Hemodinâmica – CTI Coronária – Educação Serviço.
<b>Março</b>	Farmácia – Pediatria – UTI Pediátrico – Área interna Administrativa.
<b>Abril</b>	UTR – Bloco Cirúrgico – CME – Almojarifado
<b>Mai</b>	Lactário – UIH – Clin. Cirúrgica – Clin. Médica – Ambulatório Funepu
<b>Junho</b>	CTI Adulto – CTI Coronária – Ambulatório Maria Glória
<b>Julho</b>	GO – Berçário – UTI Pediátrico
<b>Agosto</b>	Lactário – SND – Pronto Socorro Adulto e Infantil – UTR
<b>Setembro</b>	CTI Adulto – CTI Coronária – Neuro – Ortopedia – Hemodinâmica
<b>Outubro</b>	Berçário – UTI Pediátrico – Pediatria – Farmácia
<b>Novembro</b>	Almojarifado – Bloco Cirúrgico – CME – Área interna administrativa
<b>Dezembro</b>	Clin. Cirúrgica – Clin. Médica – GO – Ambulatórios Funepu e Maria da Glória.