



PROTOCOLOS DE CONTROLE DE INFECÇÃO

Protocolo de Quimioprofilaxia para Contactantes de Casos de Meningites Bacterianas

A quimioprofilaxia está indicada para os contactantes íntimos expostos até 7 dias do início dos sintomas, somente nos casos de doença meningocócica ou meningite por *Haemophilus influenzae*, que obedecem aos seguintes critérios:

1- Doença meningocócica

- Contactantes domiciliares (residentes no mesmo domicílio)
- Quartéis e orfanatos: dormir no mesmo quarto
- Creche e pré-escola: crianças da mesma sala e mesmo período
- Pessoas expostas diretamente às secreções de orofaringe, por exemplo, através de beijos
- Profissionais de saúde que tenham se exposto a secreções respiratórias **sem uso de máscara cirúrgica** durante: entubação traqueal, aspiração de secreções ou que tenham realizado respiração boca-a-boca ou exame de fundo de olho.

A quimioprofilaxia não está sempre indicada para qualquer profissional de saúde, exceto os incluídos nos critérios acima.

2- Meningite por *H. influenzae*

- Contactantes domiciliares: somente quando, além do caso índice, houver crianças menores de 4 anos susceptíveis (não vacinada ou vacinação incompleta).
- Creches e pré-escolas: apenas a partir do 2º caso confirmado, para contactantes próximos (mesma sala e mesmo período) susceptíveis.

Esquemas de profilaxia recomendados

Deve ser iniciado preferencialmente até 48 horas da exposição, admitindo-se prazo máximo de 7 dias.

1. Doença meningocócica	Rifampicina: - adultos: 600 mg VO 12/12 horas por 2 dias - crianças: 20 mg/kg/dose VO 12/12 horas por 2 dias - < 1 mês: 10 mg/kg/dia VO 12/12 horas por 2 dias Ceftriaxone: - adultos: 250mg IM dose única - crianças: 125mg IM dose única
2. <i>H. influenzae</i>	Rifampicina: - adultos: 600 mg/dia VO 1x/dia por 4 dias - crianças: 20 mg/kg VO 1x/dia por 4 dias - < 1 mês: 10 mg/kg VO 1x/dia por 4 dias

Importante: não se indica a quimioprofilaxia se a exposição do profissional de saúde ocorrer quando o paciente-fonte estiver em tratamento adequado há mais de 24 horas.

Revisão: 07/04/2017



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR**

PROTOCOLOS DE CONTROLE DE INFECÇÃO

**FICHA DE LIBERAÇÃO DE QUIMIOPROFILAXIA PARA CONTACTANTES
NOS CASOS DE MENINGITES BACTERIANAS**

Nome do Profissional _____

Setor _____

Profissão _____

Paciente-fonte _____

RG _____

Data do Contato: _____

Diagnóstico confirmado? () Sim () Não

Bacterioscopia _____

Cultura _____

Atividade de risco:

- () Intubação Orotraqueal sem uso de EPI
- () Aspiração de secreção sem uso de EPI
- () Respiração boca/boca
- () Realização de Exame de Fundo de Olho

Motivo para não uso de EPI _____

Profilaxia: () Rifampicina 600mg 12/12h por () 2 dias.

() Ceftriaxone 250mg Intra Muscular - dose única

Estou ciente dos riscos do uso da medicação acima quanto aos seus efeitos adversos como náuseas, vômitos, icterícia, hepatite medicamentosa e resistência microbiana.

Assinatura do Contactante

Assinatura da Chefia Imediata

Tanto o contactante quanto a chefia asseguram a veracidade das informações.