





## Tabela de Medicamentos de Uso Via Oral em Sonda



Medicamento/ Dosagem	Forma Farmacêutica	Administração Via Sonda	Resíduo	Volume para diluição	Recomendações para administração oral	Recomendações para administração via sonda nasoesnteral
Acetazolamida 250 mg	Comprimido	SIM	+	20 mL	Não há evidências de interações com alimento.	Triturar, diluir e administrar imediatamente. Pode ser administrado juntamente com a nutrição enteral.
Acetilcisteína 100 mg e 600 mg	Granulado	SIM	N	50-100 mL	Dissolver em 50-100 mL de água.	Dissolve sem trituração.
Aciclovir 200 mg	Comprimido	SIM	++	30 mL de água	Pode ser administrado com alimentos.	Triturar, diluir e administrar imediatamente. Pode ser administrado juntamente com a nutrição enteral.
Ácido Acetilsalicílico 100 mg	Comprimido	SIM	+	15 mL	Tomar preferencialmente após a refeição.	Dissolve sem trituração. Pode ser triturado. Pode ser administrado com a nutrição enteral.
Ácido Ascórbico 500 mg	Comprimido	SIM			Devem ser ingeridos com um pouco de líquido por via oral.	Pode ser triturado. Pode ser administrado juntamente com a nutrição enteral. Considerar o uso alternativo da solução injetável.
Ácido Fólico 5 mg	Comprimido	SIM	+++	15 mL	Os comprimidos devem ser deglutidos sem mastigação juntamente com água.	Devem ser triturados e diluídos em água. Não dissolvem sem trituração. Pode ser administrado juntamente com a nutrição enteral.
Ácido Folínico 15 mg	Comprimido	SIM	+	10 mL	Pode ser administrado com alimentos.	Dilui em 10mL de água dentro de 5 minutos. Pode ser triturado.
Ácido Ursodesoxicólico 50 mg	Comprimido	SIM	+	15 mL	Deve ser ingerido após as refeições.	Triturar, diluir e administrar imediatamente.
Ácido Valpróico 250 mg	Cápsula	NÃO	-	-	Cápsulas devem ser deglutidas sem mastigação para prevenir irritação local da boca e garganta.	Não recomendado a administração via sonda. Risco de perda de princípio ativo e aderência ao material da sonda. Utilizar a opção xarope.


Medicamento/ Dosagem	Forma Farmacêutica	Administração Via Sonda	Resíduo	Volume para dilução	Recomendações para administração oral	Recomendações para administração via sonda nasoesnteral
Ácido Valpróico 250 mg/5 mL	Xarope	Sim com restrições	Viscoso	75-100 mL	Pode ser administrado juntamente com alimentos visando redução da irritação gastrointestinal.	Devido a sua alta osmolaridade, recomenda-se diluir com volume de água adicional. Utilizar imediatamente após a diluição.
Albendazol 400 mg	Comprimido	SIM	++++	20-30 mL	Devem ser mastigados previamente a deglutição. Pode ser ingerido antes ou após as refeições, ou nos intervalos dessas.	Pode ser triturado, porém dissolve lentamente sem trituração. Preferencialmente utilizar a formulação suspensão.
Albendazol 4%	Suspensão	SIM	N	15mL	Pode ser administrado com alimentos.	Agitar previamente antes do uso.
Alopurinol 100mg	Comprimido	SIM	+++	20mL	Deve ser administrado após as refeições.	Podem ser triturados, diluídos e administrados imediatamente após a diluição.
Amiodarona 200mg	Comprimido	SIM	+++	10mL	Não há evidências de interações com alimento.	Pode ser triturado, porém dissolve sem trituração. Pode ser administrado juntamente com a nutrição enteral.
Amitriptilina 25mg	Comprimido revestido	SIM	++	15mL	Administrar preferencialmente ao deitar.	Não dissolver sem trituração. Pode ser administrado juntamente com NE. Administrar imediatamente para evitar degradação do fármaco e proteger da luz.
Amoxicilina 50mg/mL	Suspensão	SIM	Viscoso	20-50mL para cada 10mL suspensão	Alimentos não interferem na absorção. Pode ser administrado com estômago vazio ou com alimentos.	Alimentos não interferem na absorção. Devido a sua alta viscosidade, recomenda-se diluir com volume de água adicional.
Amoxicilina 500mg	Cápsula	SIM	++	10mL	Alimentos não interferem na absorção.	Administrar junto com NE para minimizar efeitos GI. Abrir cápsula e dispersar em 10 mL de água.
Ampicilina 50mg/mL	Suspensão	SIM	N	30-50mL para cada 10mL da suspensão	Deve ser ingerida com estômago vazio.	Pausar a dieta por aproximadamente 1h, realizar a lavagem da sonda, administrar o medicamento e lavar a sonda novamente antes de religar a sonda.

Medicamento/ Dosagem	Forma Farmacêutica	Administração Via Sonda	Resíduo	Volume para dilução	Recomendações para administração oral	Recomendações para administração via sonda nasoenteral
Anagrelida 0,5mg# 	Cápsula	NÃO			Cápsulas não devem ser abertas, mastigadas ou diluídas. Devem ser deglutidas com um pouco de líquido. Pode ser administrado com ou sem refeições.	Risco ocupacional para o manipulador.
Anastrozol 1mg	Comprimido simples	SIM	+	15mL	Administrar com água, sempre no mesmo horário. O comprimido não deve ser partido ou mastigado	Não dissolver sem trituração. Triturar, diluir e administrar imediatamente.
Atenolol 25mg e 50mg	Comprimido simples	SIM	+++	15mL	Administrar com água, preferencialmente no mesmo horário. O comprimido pode ser partido	Triturar, diluir e administrar imediatamente. Pode ser administrado juntamente com NE. Uso concomitante com NE reduz absorção em 20%.
Azatioprina 50mg# 	Comprimido simples	NÃO			Tomar este medicamento após as refeições ou na hora de dormir para diminuir desconforto estomacal. O comprimido não deve ser partido ou mastigado.	Risco ocupacional para o manipulador.
Baclofeno 10mg	Comprimido simples	SIM	++	15mL	Tomar durante as refeições com um pouco de líquido. Não deve ser partido ou mastigado.	Triturar, diluir e administrar imediatamente. Deve ser administrado junto com NE.
Bicalutamida 50mg# 	Comprimido revestido	NÃO			Tomar com líquido. Não deve ser partido ou mastigado. Não é necessário ajuste de dose em paciente com insuficiência renal.	Risco ocupacional para o manipulador.
Biperideno 2mg	Comprimido simples	SIM	++	15mL	Deve ser administrado com líquidos, preferencialmente durante ou após uma refeição, para minimizar os efeitos indesejáveis no sistema gastrointestinal.	Triturar, diluir e administrar imediatamente para evitar degradação do fármaco. Dissolve lentamente sem trituração.
Bisacodil 5mg	Comprimido revestido	SIM			Não deve ser mastigado, ingerido com leite ou antiácidos; deve ser ingerido inteiro, sem mastigar, com água suficiente para engolir. Deve ser administrado preferencialmente à noite para que se obtenha a evacuação pela manhã.	Pode ser triturado. Administrar juntamente com a nutrição enteral.

Medicamento/ Dosagem	Forma Farmacêutica	Administração Via Sonda	Resíduo	Volume para dilução	Recomendações para administração oral	Recomendações para administração via sonda nasoenteral
Bromocriptina 2,5mg	Comprimido simples	SIM	+ +	15mL	Deve sempre ser tomado com alimentos. É recomendável tomar o medicamento antes de dormir com leite, para prevenir o aparecimento de náuseas. O comprimido pode ser partido, mas não pode ser mastigado. A cápsula deve ser tomada inteira.	Triturar, diluir e administrar imediatamente.
Cabergolina 0,5mg	Comprimido	SIM		10mL	Recomenda-se a administração associada as refeições para aumento da tolerabilidade ao fármaco.	Triturar, diluir em água e administrar com a NE.
Cafeína, citrato	Frasco 30mL	SIM		-		
Cálcio/Cianocobalamina/Co le-calciferol/Fósforo/Zinco	Frasco 250mL	Dado não encontrado na literatura.			Deve ser agitado bem antes do uso. Este medicamento deve ser tomado por via oral, podendo ser adicionado à mamadeira, sucos, papas, etc.	
Capecitabina 	Comprimido	NÃO			Os comprimidos devem ser ingeridos por via oral, pela manhã e à noite, até 30 minutos após as refeições. Ingerir os comprimidos com água.	Risco ocupacional para o manipulador.
Captopril	Comprimido	SIM	++	20-30mL	Deve ser administrado 1 hora antes das refeições por via oral.	Pausar a dieta 40 minutos antes da administração, triturar o comprimido, diluir em 10mL de água filtrada, realizar a lavagem da sonda, administrar o medicamento, lavar a sonda novamente e religar a dieta após 40 minutos.
Carbamazepina	Comprimido	Sim com restrições	++++	20mL	Os comprimidos podem ser tomados durante, após ou entre as refeições. Os comprimidos devem ser tomados com um pouco de líquido.	Pode ser triturado. O fármaco se liga às moléculas de proteína da NE reduzindo sua absorção e aumentando aderência à sonda. Pulverizar e dispersar em 20 mL de mistura. Utilizar a opção suspensão.


Medicamento/ Dosagem	Forma Farmacêutica	Administração Via Sonda	Resíduo	Volume para diluição	Recomendações para administração oral	Recomendações para administração via sonda nasoesnteral
Carbamazepina	Frasco 100mL	SIM	-	50mL de água para cada 5 mL de solução	A suspensão oral (deve ser agitada antes do uso) podem ser tomados durante, após ou entre as refeições.	A suspensão oral contém sorbitol, podendo causar distúrbio estomacal e diarreia.  O fármaco se liga às moléculas de proteína da NE reduzindo sua absorção e aumentando aderência à sonda.
Carbonato de Cálcio	Cápsula	SIM		15mL	Os comprimidos devem ser administrados durante as refeições.	Pode ser triturado. Após diluição administrar imediatamente.
Carvão ativado	Pote 20g	SIM				Insolúvel em água.
Carvedilol	Comprimido	SIM	+	15mL	Deve ser administrado por via oral.	Triturar, diluir e administrar imediatamente. Administrar juntamente com a nutrição enteral para minimizar hipotensão ortostática.
Cefalexina	Frasco 60mL	SIM	++++	20-50mL de água para cada 10mL de suspensão (500mg)	Deve ser administrado somente por via oral.	Pausar a dieta 1 hora antes e 1 hora depois da administração do medicamento.  O fármaco se liga às moléculas de proteína da NE reduzindo sua absorção e aumentando aderência à sonda.
Cefalexina	Comprimido	SIM	+	20mL		
Cetoconazol	Comprimido	SIM	++	20mL	O cetoconazol deve ser administrado por via oral durante uma das refeições diárias, para absorção máxima. Quando a acidez gástrica está reduzida, a absorção do cetoconazol dos comprimidos de cetoconazol é reduzida.	Triturar, diluir e administrar imediatamente.
Cetoprofeno	Cápsula	Sim com restrições	+++	15mL	Deve ser administrado preferencialmente durante ou após as refeições.	A cápsula pode ser aberta e o conteúdo dissolvido em água, imediatamente antes da administração. Irrigar a sonda antes e ao término da administração do medicamento.

Medicamento/ Dosagem	Forma Farmacêutica	Administração Via Sonda	Resíduo	Volume para diluição	Recomendações para administração oral	Recomendações para administração via sonda nasoesnteral
Ciclofosfamida 	Comprimido revestido	NÃO			Deve ser administrado por via oral, inteiros e com um pouco de líquido.	Risco ocupacional para o manipulador.
Ciclosporina 	Cápsula	NÃO			As cápsulas devem ser deglutidas inteiras com um pouco de água.	Risco ocupacional para o manipulador.
Ciprofloxacino	Comprimido revestido	Sim com restrições	+++	20 mL	Interage com os íons da alimentação.	*Não recomendado. Quando se fizer necessário, triturar, diluir e administrar imediatamente ou utilizar Ciprofloxacino injetável. Não administrar junto com a nutrição (pausar a dieta 1 hora antes e 1 hora depois da administração do medicamento).
Claritromicina	Comprimido revestido	NÃO			A ingestão de alimentos, pouco antes da administração dos comprimidos de claritromicina, pode atrasar ligeiramente o início da absorção deste medicamento; entretanto, não prejudica a sua biodisponibilidade nem as suas concentrações no organismo.	Não há dados específicos para a administração enteral desta apresentação.
Clindamicina, cloridrato	Cápsula	SIM	++	15mL	Deve ser administrado com um copo cheio de água (200mL).	Após abertura da cápsula, administrar imediatamente. Administração concomitante com NE reduz a velocidade de sua absorção.

Medicamento/ Dosagem	Forma Farmacêutica	Administração Via Sonda	Resíduo	Volume para diluição	Recomendações para administração oral	Recomendações para administração via sonda nasoesnteral
Medicamento/ Dosagem	Forma Farmacêutica	Administração Via Sonda	Resíduo	Volume para diluição	Recomendações para administração oral	Recomendações para administração via sonda nasoesnteral
Clobazam	Comprimido	SIM	++	15mL	A administração de clobazam comprimidos com a alimentação, retarda a absorção em aproximadamente 1 hora, mas não afeta a extensão total da absorção. Clobazam pode ser administrado distante das refeições.	Triturar, diluir e administrar imediatamente.
Clonazepam	Frasco 20mL	SIM	-	15mL de água para cada 40 gotas	Deve ser administrado por via oral. As gotas devem ser dissolvidas em um pouco de líquido não alcoólico. Nunca administrar as gotas diretamente na boca.	Cuidado em situações de disfagia e rebaixamento de nível de consciência.
Clonazepam	Comprimido	SIM	+++	15mL	Os comprimidos devem ser ingeridos por via oral, com um pouco de líquido não alcoólico.	Triturar, diluir e administrar imediatamente.
Clonidina	Comprimido	Sim com restrições			Os comprimidos devem ser ingeridos por via oral, com um pouco de líquido não alcoólico.	Pode ser triturado. Pode ser administrado juntamente com a nutrição enteral. Avaliar o uso alternativo da solução injetável devido peculiaridades farmacocinéticas.
Clopidogrel	Comprimido revestido	SIM	++	15mL	Pode ser administrado com líquido por via oral, na presença ou ausência de alimentos.	Não dissolve sem trituração. Pode ser triturado. Administrar junto com a nutrição enteral para minimizar efeitos gastrintestinais.
Clorambucil 	Comprimido	NÃO			Deve ser administrado por via oral e deve ser tomado diariamente, com o estômago vazio (pelo menos uma hora antes ou três horas após as refeições).	Risco ocupacional para o manipulador.

Medicamento/ Dosagem	Forma Farmacêutica	Administração Via Sonda	Resíduo	Volume para diluição	Recomendações para administração oral	Recomendações para administração via sonda nasoenteral
Cloreto de potássio	Drágea	NÃO	-	-	Deve ser administrado após as refeições com um copo cheio de água, pois a presença de alimento no estômago não altera a absorção e evita a irritação gástrica.	Não deve ser macerado, pois perde a característica de liberação gradativa, além de possuir revestimento que quando macerado causa obstrução da sonda. Alternativas: Cloreto de potássio 6% xarope ou cloreto de potássio injetável.
Cloreto de potássio	Solução Oral	Sim com restrições			Deve ser administrado após as refeições, pois a presença de alimento no estômago não altera a absorção e evita a irritação gástrica.	Fisicamente incompatível com a nutrição. Recomenda-se administrar 1 hora antes ou no mínimo 1 hora após a nutrição.
Clorpromazina, cloridrato	Comprimido	Sim com restrições	++	15mL	O paciente deve tomar os comprimidos com líquido, por via oral.	Pode ser triturado. Administração concomitante com NE causa precipitação devido à incompatibilidade com íons cálcio, zinco, magnésio e alumínio. Utilizar a opção gotas.
Clorpromazina, cloridrato	Frasco 20mL	SIM	-	15mL	Deve ser administrado por via oral. Deve-se gotejar com o frasco na vertical e bater levemente no fundo para iniciar o gotejamento. Nunca administrar as gotas diretamente na boca.	Administrar a solução diretamente sem diluição. Administração concomitante com nutrição enteral causa precipitação devido à incompatibilidade com íons cálcio, zinco, magnésio e alumínio.
Clortalidona	Comprimido	SIM	+++	15mL	Administrar preferencialmente pela manhã com alimentos e um copo de água.	Dissolve sem trituração. Diluir e administrar imediatamente.
Cobre, quelato	Frasco 30mL	SIM	-	-	Administrado preferencialmente pela manhã, mas pode-se iniciar no período vespertino.	Não diluir.
Codeína, fosfato/paracetamol	Comprimido	SIM	++++	20mL	Devem ser ingeridos com um pouco de líquido.	Triturar, diluir e administrar imediatamente.





Medicamento/ Dosagem	Forma Farmacêutica	Administração Via Sonda	Resíduo	Volume para diluição	Recomendações para administração oral	Recomendações para administração via sonda nasoenteral
Colchicina	Comprimido	SIM	+	15mL	Devem ser ingeridos com um pouco de líquido.	Triturar, diluir e administrar imediatamente. Grânulos com princípio ativo muito irritante. Observar efeitos laxativos. Avaliar o tratamento terapêutico.
Complexo B	Drágea	SIM	+	20mL	Devem ser ingeridos com um pouco de líquido.	Pode ser triturado. Não dissolve sem trituração.
Complexo B	Drágea	SIM	+	20mL	Devem ser ingeridos com um pouco de líquido.	Pode ser triturado. Não dissolve sem trituração.
Dapsona	Cápsula	SIM	+	10mL	Os comprimidos devem ser ingeridos com água ou outro líquido, junto às refeições ou sem relação com elas.	Triturar, dispersar em água e administrar imediatamente. Não é compatível com a nutrição enteral. Pausar a dieta e administrar uma hora antes ou duas horas após a nutrição.
Dasatinibe 	Comprimido	NÃO			Eles devem ser ingeridos inteiros. Pode ser administrado junto ou não com a alimentação, pela manhã ou à noite.	Risco ocupacional para o manipulador.
Dexametasona	Comprimido	SIM	+++	15mL	Devem ser ingeridos com um pouco de líquido.	Pode ser triturado. Administrar junto com NE. Preferir a opção elixir.
Dexametasona	Frasco 120mL	SIM		15mL		
Dexclorfeniramina	Comprimido	SIM	+	20 mL	Devem ser ingeridos com um pouco de líquido, por via oral.	Pode ser triturado. Administrar junto com NE para minimizar efeitos GI.
Dexclorfeniramina	Solução oral	SIM		20 mL de água para cada 5 mL de solução oral.		Pode retardar o esvaziamento gástrico e diminuir a motilidade gastrointestinal

Medicamento/ Dosagem	Forma Farmacêutica	Administração Via Sonda	Resíduo	Volume para diluuição	Recomendações para administração oral	Recomendações para administração via sonda nasoenteral
Diazepam	Comprimido	SIM	+	15 mL	Devem ser ingeridos com um pouco de líquido, por via oral.	Pode ser triturado. Administrar junto com NE para aumentar sua absorção.
Diclofenaco potássico	Drágea	SIM	++++	20 mL	As drágeas de diclofenaco potássico devem ser ingeridas inteiras com água ou outro líquido, de preferência antes das refeições ou com o estômago vazio.	Triturar o comprimido.
Digoxina	Comprimido	SIM	+	15 mL	Deve ser administrada exclusivamente por via oral. A administração após as refeições retarda a taxa de absorção, mas geralmente sem alterar a quantidade total de digoxina absorvida. Entretanto, quando a refeição é rica em fibras, a absorção de digoxina pode ser menor.	Pode ser triturado. Observar efeitos laxativos. Administração concomitante com NE, sobretudo com fibras, reduz sua absorção. Utilizar a opção elixir. Se necessário, triturar e dispersar em água por 2 minutos.
Digoxina	Elixir	SIM	+	1 mL de água para cada 1 mL de elixir	Uso exclusivamente oral. Utilizar o conta-gotas graduado que acompanha a medicação. A administração após as refeições retarda a taxa de absorção, mas geralmente sem alterar a quantidade total de digoxina absorvida. Entretanto, quando a refeição é rica em fibras, a absorção de digoxina pode ser menor.	
Diltiazem	Comprimido	SIM	+++	15 mL	Deve ser administrado por via oral, preferencialmente antes das refeições e ao deitar.	Triturar, diluir e administrar imediatamente. Pode ser administrado juntamente com a nutrição enteral.
Dipirona	Comprimido	SIM		15 mL	Deve ser administrado com um pouco de líquido por via oral.	Pode ser triturado. Pulverizar e dispersar em 20mL de água. Utilizar a opção gotas.

Medicamento/ Dosagem	Forma Farmacêutica	Administração Via Sonda	Resíduo	Volume para diluição	Recomendações para administração oral	Recomendações para administração via sonda nasoenteral
Dipirona	Solução oral	SIM		10-20 mL de água para cada 20 gotas de solução	Deve ser administrado por via oral na presença ou ausência de alimento.	
Domperidona	Comprimido	SIM	+	15 mL	Favorece o esvaziamento gástrico e estimula a motilidade intestinal	Triturar o comprimido. Utilizar a opção suspensão.
Domperidona	Suspensão oral	SIM		10 mL de água para cada 10 mL de suspensão	Favorece o esvaziamento gástrico e estimula a motilidade intestinal	
Doxiciclina	Comprimido revestido	Sim com restrições	+	50mL	Não deve ser ingerido antes de deitar, pois pode induzir a inflamação e ou ulceração do esôfago. Também é recomendado a ingestão de bastante líquido junto ao medicamento para reduzir este risco. Não deve ser partido ou mastigado	Triturar e diluir em água. Risco de obstrução de sonda.
Ergometrina	Comprimido	Dados não disponíveis na literatura	-	-	Interações com alimentos não foram documentadas.	Considerar via alternativa de administração.
Espironolactona 25mg	Comprimido	SIM	++	15mL	Interações com alimentos não foram documentadas.	Pode ser triturado, diluir e administrar imediatamente após. Administrar junto com NE para aumentar sua absorção, e minimizar seus efeitos GI.
Espironolactona 100mg	Comprimido	SIM	++++	20mL	Interações com alimentos não foram documentadas.	
Espironolactona	Suspensão Oral	SIM	Viscoso		Interações com alimentos não foram documentadas.	Devido a sua alta viscosidade, recomenda-se diluir com volume de água adicional e agitar vigorosamente.
Etambutol	Comprimido	SIM	++	20mL	A concentração plasmática pode ser atrasada ou reduzida pela ingestão concomitante com alimentos gordurosos ou terapia antiácida.	Triturar, diluir e administrar imediatamente. Administrar junto com NE para minimizar seus efeitos GI.

Medicamento/ Dosagem	Forma Farmacêutica	Administração Via Sonda	Resíduo	Volume para diluição	Recomendações para administração oral	Recomendações para administração via sonda nasoenteral
Fenitoína	Comprimido	SIM	+	15mL	Você deve tomar os comprimidos com líquido, por via oral. As doses orais devem ser tomadas preferencialmente durante ou após as refeições.	Monitorar o nível sérico, pois a administração de fenitoína e dieta enteral pode acarretar a diminuição da absorção do fármaco. Recomenda-se pausar a dieta enteral 1 hora antes e 2 horas depois da administração. Via alternativa disponível: Parenteral
Fenobarbital	Comprimido	SIM	++	10-20mL	Interações com alimentos não foram documentadas.	Diluir em água sem triturar e administrar imediatamente. Pode ser triturado e administrado juntamente com a nutrição enteral, caso necessário. Via alternativa disponível: Parenteral
Fenobarbital	Frasco 20mL	SIM	-	20-30mL	Interações com alimentos não foram documentadas.	Aproximadamente 1 a 3,8 g de sorbitol por dose diária. Preferível uso do comprimido.
Fluconazol	Cápsula	SIM	++	15mL	A presença de alimento e o pH não interfere na absorção do fármaco.	Abrir a cápsula, diluir e administrar imediatamente. Dissolve lentamente sem trituração. Pode ser triturado. Não usar sondas de PVC.
Flunarizina, cloridrato	Cápsula	SIM		20mL	Pode-se iniciar o uso apenas com uma cápsula à noite ao deitar, aumentando de acordo com a severidade da doença para uma cápsula pela manhã e outra à noite.	Abrir a cápsula, diluir e administrar imediatamente. Compatível com a nutrição enteral.
Fluoxetina, cloridrato	Cápsula	SIM	+	20mL	Deve ser administrado por via oral e pode ser tomado independente das refeições.	Abrir a cápsula, diluir e administrar imediatamente.
Furosemida	Comprimido	SIM	+	15mL	Recomenda-se a administração com estômago vazio para prevenção de interação com alimentos, com um pouco de água.	Preferir a opção suspensão. Pode ser triturado, mas dissolve sem trituração. Administrar junto com NE para minimizar efeitos GI.
Furosemida	Frasco 50mL	SIM	Viscoso	30mL	A administração com alimentos retarda sua absorção.	



Medicamento/ Dosagem	Forma Farmacêutica	Administração Via Sonda	Resíduo	Volume para diluição	Recomendações para administração oral	Recomendações para administração via sonda nasoenteral
Gabapentina	Cápsula	SIM		20 mL	Pode ser administrado via oral na presença ou ausência de alimento.	Abri a cápsula, diluir em água e administrar imediatamente. Medicamento compatível com a NE.
Glibenclamida	Comprimido	SIM	+++	15mL	Não há dados disponíveis sobre a interferência dos alimentos na ação do medicamento.	Triturar. Diluir e administrar imediatamente. Administração concomitante com NE reduz absorção.
Haloperidol	Comprimido	SIM	+	15mL	Deve ser administrado com um pouco de líquido por via oral.	Pode ser triturado. Preferível uso da solução injetável ou solução oral.
Haloperidol	Frasco 20mL	SIM	-	10mL de água para cada 10 gotas	A solução oral poderá ser administrada junto às refeições ou entre elas. As gotas podem ser dissolvidas em uma pequena quantidade de água ou de suco de frutas.	Administração concomitante com NE causa precipitação devido ao seu pH ácido (pH < 3,5). Diluir em 10 mL de água. Preferível uso da solução injetável.
Hidralazina	Comprimido	SIM	+++	15mL	Deve ser administrado por via oral, todos os dias no mesmo horário, sempre da mesma forma, com ou sem alimentos.	Triturar, diluir e administrar imediatamente. Absorção rápida após sua administração. Redução significativa da biodisponibilidade quando administrado com nutrição enteral.
Hidrato de Cloral	Frasco 100mL	SIM	Viscoso		Recomenda-se a administração com bastante água. Proteger da luz para evitar degradação.	Recomenda-se diluir em um pouco de água para favorecer a fluidez da solução.
Hidroclorotiazida	Comprimido	SIM	++	15mL	Os comprimidos devem ser administrados com líquidos, por via oral.	Triturar, diluir e administrar imediatamente. Pode ser triturado. Administração concomitante com NE reduz absorção. Absorção limitada ao duodeno e parte proximal do jejuno.
Hidroclorotiazida	Frasco 60mL	SIM	-	-	Recomenda-se a administração na presença de alimentos para evitar irritação gástrica.	Administrar sem diluição prévia.
Hidróxido de Alumínio	Frasco 100 mL	SIM	Viscoso	20mL de água para cada 10mL de suspensão	Recomenda-se a administração uma hora após as refeições e ao deitar, ou de acordo com orientação médica.	Devido sua viscosidade, recomenda-se diluir em água. Pode retardar o esvaziamento gástrico e diminuir a motilidade gastrointestinal.


Medicamento/ Dosagem	Forma Farmacêutica	Administração Via Sonda	Resíduo	Volume para diluição	Recomendações para administração oral	Recomendações para administração via sonda nasoenteral
Hidroxiuréia 	Cápsula	NÃO			Deve ser administrado por via oral com um pouco de líquido.	Risco ocupacional para o manipulador.
Ibuprofeno	Frasco 20mL	SIM	-	20mL para cada 40 gotas	Não precisa diluir. Deve ser administrado por via oral. A presença de alimentos reduz a absorção do medicamento.	Compatível com a nutrição enteral.
Imatinibe, mesilato 	Comprimido	NÃO			Tome com uma refeição para ajudar a proteger seu estômago. Deve ser deglutido com um copo de água. Caso você tenha dificuldade você pode dissolvê-los em um copo de água ou suco de maçã: Coloque o número de comprimidos necessários em um volume apropriado de bebida (aproximadamente 50 mL para um comprimido de 100 mg, e 200 mL para um comprimido de 400 mg). Misture com o auxílio de uma colher para dissolução completa do(s) comprimido(s). Beber imediatamente todo o conteúdo do copo. Você pode deixar traços do comprimido desintegrado no copo após beber.	Risco ocupacional para o manipulador.
Indometacina	Cápsula	SIM	++	15mL	Deve ser administrado por via oral com um pouco de líquido. A presença de alimento no estômago reduz a taxa de absorção da indometacina, mas tem pouco ou nenhum efeito na sua extensão, podendo ser administrado na presença ou ausência de alimento.	Abrir a cápsula e diluir em água. Compatível com a nutrição enteral.

Medicamento/ Dosagem	Forma Farmacêutica	Administração Via Sonda	Resíduo	Volume para diluição	Recomendações para administração oral	Recomendações para administração via sonda nasoenteral
Isoniazida	Comprimido	SIM	+	10-20mL	A administração da isoniazida deve ser feita pela manhã, em jejum com algum líquido, sem mastigar, pois a alimentação pode prejudicar sua absorção. Em caso de grande desconforto digestivo, recomenda-se administrar após uma refeição leve.	Triturar, diluir e administrar imediatamente. Pausar a dieta 1 hora antes e 1 hora após a administração do medicamento.
Isossorbida, dinitrato 5mg	Comprimido SL	Sim com restrições	+	10mL	O comprimido sublingual deve ser colocado e mantido abaixo da língua, até completa dissolução.	Não se aconselha a administração via sonda, pois há alteração nas propriedades do fármaco, desencadeando variações séricas. Pode usar via sonda em pacientes com diminuição do nível de consciência ou disfagia.
Isossorbida, dinitrato 10mg	Comprimido	SIM			Os comprimidos deverão ser ingeridos, sem mastigar, com um pouco de líquido e administrados por via oral, de preferência com o estômago vazio.	
Isossorbida, mononitrato 20mg	Comprimido	SIM	+	15mL	Deve ser administrado por via oral, sem mastigar e com líquido suficiente para engolir.	Triturar, diluir e administrar imediatamente. Administração concomitante com NE reduz absorção.
Itraconazol	Cápsula	SIM	++++	15mL	Deve ser administrado por via oral e imediatamente após uma refeição. As cápsulas devem ser tomadas inteiras com auxílio de água.	Abrir a cápsula, diluir e administrar imediatamente.
Ivermectina	Comprimido	SIM	++	15mL	Os comprimidos de devem ser ingeridos com água, por via oral.	Triturar, diluir e administrar imediatamente.

Medicamento/ Dosagem	Forma Farmacêutica	Administração Via Sonda	Resíduo	Volume para diluição	Recomendações para administração oral	Recomendações para administração via sonda nasoenteral
Levofloxacino 500mg	Comprimido revestido	SIM	++	15mL	Devem ser administrados por via oral independente das refeições.	Triturar, diluir e administrar imediatamente. Não dissolve sem trituração. Pausar a dieta 1 hora antes e 1 hora depois da administração do medicamento.
Levomepromazina, cloridrato	Frasco 20mL	SIM		10mL de água para cada 40 gotas	Deve ser diluído em água açucarada e nunca instalado diretamente sobre a língua.	Diluir em água e administrar imediatamente.
Levomepromazina, maleato	Comprimido	SIM		10mL	Você deve tomar os comprimidos com líquido, por via oral.	Deve ser diluído em 10mL de água.
Levotiroxina sódica	Comprimido	SIM	+	15mL	Os alimentos podem interferir na absorção do medicamento. Recomenda-se a administração com estômago vazio (1 hora antes ou 2 horas após a refeição).	Triturar, diluir e administrar imediatamente. Pausar a dieta 1 hora antes e 1 hora após a administração do medicamento.
Loperamida, cloridrato	Comprimido	NÃO			Os comprimidos devem ser tomados com líquido	Não há dados específicos na literatura.
Lorazepam	Comprimido	SIM	++	15mL	Deve ser administrado via oral conforme orientação médica.	Dissolve sem trituração. Diluir sem triturar e administrar imediatamente.
Losartana Potássica 25mg	Comprimido	SIM	++	20mL	Pode ser administrado na presença ou ausência de alimentos.	Compatível com nutrição enteral.
Mebendazol	Frasco 30mL	SIM	-	15mL	Mebendazol deve ser administrado por via oral. Não é necessário seguir uma dieta especial ou utilizar produtos que estimulem a evacuação.	Administrar a solução diretamente sem diluição. Pode ser administrado juntamente com a nutrição enteral.
Megestrol, acetato	Comprimido	SIM	-	20mL	Não são conhecidas informações sobre interações com alimentos e medicamentos.	Dissolve sem trituração, mas pode ser triturado também.



Medicamento/ Dosagem	Forma Farmacêutica	Administração Via Sonda	Resíduo	Volume para diluição	Recomendações para administração oral	Recomendações para administração via sonda nasoenteral
Melfalana 	Comprimido revestido	NÃO			Deve ser administrado por via oral, inteiros, com um pouco de líquido, conforme orientação médica.	Risco ocupacional para o manipulador.
Mercaptopurina 	Comprimido	NÃO		10mL	Recomenda-se a administração 1 hora antes ou 3 horas após a administração de alimentos, incluindo leite.	Risco ocupacional para o manipulador.
Metadona	Comprimido	SIM	++	15mL	Deve ser administrado via oral conforme orientação médica.	Recomenda-se triturar, diluir e administrar imediatamente. Em sondas muito finas pode causar obstrução.
Metformina, cloridrato	Comprimido	Sim com restrições	++	15-20mL	Pode ser administrado na presença ou ausência de alimentos. Em caso de realização de exames radiológicos utilizando meios de contraste contendo iodo, recomenda-se a interrupção do medicamento por determinado tempo antes e após o exame.	Para evitar possível obstrução da sonda, recomenda-se triturar na forma de um pó fino, acrescentar água para formar uma pasta isenta de partículas maiores e após acrescentar o volume adequado de água.
Metildopa 250mg e 500mg	Comprimido revestido	SIM	+++	15-20mL	Tome metildopa diariamente com um pouco de água, exatamente conforme a orientação de seu médico.	Para evitar possível obstrução da sonda, recomenda-se triturar na forma de um pó fino, acrescentar água para formar uma pasta isenta de partículas maiores e após acrescentar o volume adequado de água.
Metoclopramida, cloridrato	Comprimido	SIM	+	15mL	A administração de comprimidos deve ser feita 10 minutos antes das refeições. O comprimido deve ser ingerido com líquido, por via oral.	Se possível utilizar a forma farmacêutica gotas adicionada a 15mL de água.
Metoclopramida, cloridrato	Frasco 10mL	SIM	-	15mL	Deve ser administrado por via oral, 10 minutos antes das refeições	

Medicamento/ Dosagem	Forma Farmacêutica	Administração Via Sonda	Resíduo	Volume para diluição	Recomendações para administração oral	Recomendações para administração via sonda nasoenteral
Metronidazol 250 e 400mg	Comprimido	Sim com restrições		20mL	Os comprimidos devem ser deglutidos inteiros, sem mastigar, com quantidade suficiente de líquido (aproximadamente 1 copo d' água).	Quando possível utilizar a forma farmacêutica suspensão oral, adicionando 20mL de água para cada 10mL de suspensão ou utilizar a via intravenosa que está disponível em bolsas de 500mg/100mL. Risco de obstrução de sonda.
Metronidazol 4%	Frasco 100mL	SIM	+	20mL de água para cada 10mL de suspensão	Deve ser administrado por via oral. Recomenda-se que seja utilizado o copo medida graduado que acompanha o frasco na embalagem.	
Micofenolato mofetila 360mg e 500mg 	Comprimido revestido	NÃO			Proteger da luz. Engula o comprimido inteiro com um copo de água, sem quebrar ou esmagar.	Risco ocupacional para o manipulador.
Midazolam, maleato	Comprimido revestido	Sim com restrições	+++	15mL	Os comprimidos devem ser deglutidos inteiros, sem mastigar, com quantidade suficiente de líquido antes de deitar.	Triturar o comprimido e dissolver em água e administrar imediatamente. Quando possível utilizar midazolam solução.
Midazolam	Frasco 10mL	SIM	-	10mL de água para cada 10 gotas	Recomenda-se a administração com estômago vazio para sedação prévia a procedimento.	
Minoxidil	Comprimido	SIM		10mL	Deve ser administrado por via oral, com ingestão de quantidade suficiente de líquido	Pode ser triturado. Dispersar o comprimido na quantidade adequada de água.
Morfina, sulfato 10mg	Comprimido	Sim com restrições	+++	15mL	Deve ser administrado por via oral, com ingestão de quantidade suficiente de líquido	Embora possa ser triturado, sua administração via sonda não é recomendado.

Medicamento/ Dosagem	Forma Farmacêutica	Administração Via Sonda	Resíduo	Volume para diluição	Recomendações para administração oral	Recomendações para administração via sonda nasoenteral
Morfina, sulfato 30mg	Comprimido	Sim com restrições	++++	20mL	Deve ser administrado por via oral, com ingestão de quantidade suficiente de líquido	Embora possa ser triturado, sua administração via sonda não é recomendado.
Multivitamínico  Vitamina A (palmitato de retinol); Vitamina B1 (cloridrato de tiamina); Vitamina B2 (fosfato sódico de riboflavina); Vitamina B3 (nicotinamida); Vitamina B5 (dexpantenol); Vitamina B6 (cloridrato de piridoxina); Vitamina B8 (biotina) Vitamina C (ácido ascórbico); Vitamina D2 (ergocalciferol); Vitamina E (acetato de racealfatoferol)	Frasco 20mL	SIM		15mL para cada 20gotas	Deve ser administrado por via oral, com água, suco ou ainda de acordo com orientação médica.	
Neomicina, sulfato	Cápsula	SIM		10mL	Deve ser administrado por via oral, inteiros, com um pouco de líquido, conforme orientação médica.	Triturar e diluir em 10mL de água. Não é compatível com a nutrição enteral. Administrar 15 minutos antes da nutrição.
Nifedipina 10mg	Cápsula SL	NÃO			Pode ser administrada na presença ou ausência de alimento.	Não é recomendado, pois a dose pode ser incompleta e o conteúdo pode aderir- se à parede da sonda causando obstrução.
Nifedipina 20mg	Comprimido	SIM		15mL	Deve ser ingerido por via oral, com um pouco de líquido, independentemente das refeições.	Triturar o comprimido, diluir em 15mL de água, pausar a dieta, realizar a lavagem da sonda, administrar o medicamento e lavar a sonda novamente antes de religar a dieta.
Nifedipina retard 20mg	Comprimido revestido	NÃO			Deve ser ingerido por via oral, com um pouco de líquido, independentemente das refeições.	Risco de obstrução da sonda pelo revestimento. Não deve ser triturado, pois perde as características de liberação controlada. Alteração na biodisponibilidade (risco de superdosagem)

Medicamento/ Dosagem	Forma Farmacêutica	Administração Via Sonda	Resíduo	Volume para diluição	Recomendações para administração oral	Recomendações para administração via sonda nasoenteral
Nilotinibe 	Cápsula	NÃO			A biodisponibilidade do nilotinibe é aumentada pelos alimentos. Não deve ser tomado junto com alimentos. Deve ser ingerido duas horas após a refeição.	Risco ocupacional para o manipulador.
Nimodipino	Comprimido	SIM	+	20mL	Os comprimidos revestidos de nimodipino devem ser ingeridos com um pouco de líquido.	Pode ser triturado, diluído e administrado imediatamente.
Nitrofurantoína	Comprimido	SIM		20mL	A ingestão de nitrofurantoína acompanhada de alimentação reduz a frequência de eventos adversos gastrintestinais.	Triturar e diluir em 20mL de água. Não compatível com nutrição enteral. Administrar 1 hora antes ou duas horas após a nutrição enteral.
Norfloxacino	Comprimido	SIM	+	15mL	Deve ser ingerido com um copo de água, no mínimo uma hora antes ou duas horas depois das refeições ou da ingestão de leite. Polivitamínicos, outros produtos contendo ferro ou zinco, antiácidos contendo magnésio e alumínio, sucralfato ou didanosina (em comprimidos mastigáveis tamponados ou em pó pediátrico para solução oral) devem ser tomados somente duas horas depois da administração de norfloxacino.	Triturar, diluir e administrar imediatamente.
Óleo Mineral	Frasco 100mL	Sim com restrições	Viscoso	100mL	Administrar com o estômago vazio, 2 horas antes da refeição.	Não recomendado devido risco de obstrução da sonda. Caso necessário, utilizar diluído em 100mL de água.

Medicamento/ Dosagem	Forma Farmacêutica	Administração Via Sonda	Resíduo	Volume para diluição	Recomendações para administração oral	Recomendações para administração via sonda nasoenteral
Omeprazol	Cápsula	NÃO			As cápsulas devem ser tomadas imediatamente antes das refeições, preferencialmente pela manhã. Para os pacientes que tiverem dificuldade em engolir, as cápsulas podem ser abertas e os microgrânulos intactos misturados com pequena quantidade de suco de frutas ou água fria e tomados imediatamente. Os microgrânulos não devem ser mastigados e nem misturados com leite antes da administração.	Avaliar o uso alternativo de pó para solução injetável ou ou troca por ranitidina.
Omeprazol, magnésio	Comprimido revestido	SIM	+++	20mL	Deve ser administrado por via oral, pela manhã, ingerindo os comprimidos inteiros com meio copo de líquido (água). Pode ser administrado com ou sem alimentos.	Dissolve sem trituração. Não macerar. Diluir e administrar imediatamente.
Oseltamivir, fosfato	Comprimido	SIM	+	15mL	Pode ser administrado na presença ou ausência de alimento. Entretanto, a administração com alimento pode aumentar a tolerabilidade em alguns pacientes.	Não dissolve sem trituração. Pausar a dieta e irrigar a sonda antes e ao término da administração do medicamento.
Oxcarbazepina	Comprimido	SIM	++	15mL	Os comprimidos devem ser tomados com líquido. A alimentação não tem efeito na proporção e extensão da absorção da oxcarbazepina, portanto, oxcarbazepina pode ser administrada com ou sem alimentação	Preferir a opção suspensão.

Medicamento/ Dosagem	Forma Farmacêutica	Administração Via Sonda	Resíduo	Volume para diluição	Recomendações para administração oral	Recomendações para administração via sonda nasoenteral
Oxcarbazepina	Frasco 100mL	SIM	-	30-50mL de água para cada 10mL de suspensão.	A suspensão de oxcarbazepina deve ser agitada vigorosamente antes do uso e a dose a ser tomada deve ser medida logo após a agitação do líquido. A oxcarbazepina pode ser ingerida com ou sem alimentação	
Paracetamol	Comprimido	SIM	+++	20-40mL	Os comprimidos devem ser administrados por via oral, com líquido. O paracetamol pode ser administrado independentemente das refeições.	Utilizar a solução oral ou gotas.
Paracetamol	Frasco 15mL	SIM	-	15mL	A administração juntamente com alimentos retarda sua absorção.	
Periciazina	Frasco 20mL	SIM		10mL de água para cada 40 gotas	Administrar as gotas diluídas em água açucarada, por via oral.	
Pirazinamida	Comprimido	SIM	+++	20mL	Os comprimidos devem ser administrados preferencialmente com água, em jejum. Em caso de desconforto gastrointestinal podem ser administrados em horário próximo da refeição da manhã, em dose única diária.	Triturar, diluir e administrar imediatamente.
Pirimetamina	Comprimido	SIM	+++	15mL	Não se dispõe até o momento de informação sobre possível interferência negativa de alimentos na absorção da pirimetamina.	Pode ser triturado. Não dissolve sem trituração.
Poliestirenosulfonato de cálcio	Envelope 30g	Sim com restrições			A resina não deve ser administrada em sucos de frutas que tenham um alto conteúdo de potássio.	Se houver dificuldade na deglutição, a resina pode ser administrada através de sonda gástrica de 2 a 3 mm de diâmetro e, se desejado, misturada a uma dieta apropriada para insuficiência renal.




Medicamento/ Dosagem	Forma Farmacêutica	Administração Via Sonda	Resíduo	Volume para diluição	Recomendações para administração oral	Recomendações para administração via sonda nasoenteral
Prednisolona, acetato	Frasco 60mL	SIM		15mL	Deve ser administrado por via oral com o auxílio da pipeta dosadora que acompanha o medicamento.	Administrar imediatamente sem diluir. Administrar junto com a nutrição enteral.
Prednisona	Comprimido	SIM	+++	15mL	Este medicamento deve ser administrado com líquido, por via oral.	Diluir e administrar imediatamente. Melhor substituir por equivalente terapêutico em solução oral.
Prometazina, cloridrato	Comprimido	SIM	++	15mL	Este medicamento deve ser administrado com líquido, por via oral.	Não dissolve sem trituração.
Propafenona, cloridrato	Comprimido	SIM	+++	15mL	Devido a seu sabor amargo e ao efeito anestésico superficial da substância ativa, os comprimidos revestidos devem ser deglutidos inteiros com um pouco de líquido, sem mastigar.	Triturar, diluir e administrar imediatamente.
Propiltiouracila	Comprimido	SIM	+	15mL	Este medicamento deve ser administrado com líquido, por via oral.	Triturar, diluir e administrar imediatamente.
Propranolol, cloridrato	Comprimido	SIM	++	15mL	Os comprimidos devem ser administrados por via oral, engolidos inteiros, com água.	Triturar, diluir e administrar imediatamente.
Ranitidina, cloridrato	Comprimido	SIM	++	15mL	Os comprimidos devem ser administrados com um copo de água.	Utilizar preferencialmente a solução.
Ranitidina, cloridrato	Frasco 120mL	SIM	-	30-40mL de água para cada 10mL de xarope	Recomenda-se não misturar ou diluir a solução com nenhuma outra preparação líquida.	
Reidratante oral	Envelope 27,9g	Dado na literatura não encontrado			Após preparo da solução, o que não for consumido em 24 horas deverá ser desprezado. As soluções para terapia de reidratação oral não interagem com alimentos, podendo manter a alimentação habitual durante seu uso.	

Medicamento/ Dosagem	Forma Farmacêutica	Administração Via Sonda	Resíduo	Volume para diluição	Recomendações para administração oral	Recomendações para administração via sonda nasoenteral
Rifampicina/ Isoniazida/ Pirazinamida/ Etambutol	Comprimido	NÃO			O produto deve ser ingerido pela manhã, em jejum ou duas horas após a refeição, com algum líquido, sem mastigar. Risco de interação entre a isoniazida e os alimentos riscos em tiramina e histamina.	Não há estudos garantindo a segurança da administração.
Rifampicina	Cápsula	Sim com restrições	++++	50mL	A absorção do medicamento é reduzida quando o mesmo é ingerido com alimentos. Recomenda-se a administração em jejum ou no mínimo 30 minutos antes das refeições ou 2 horas após as refeições.	Abrir a cápsula. Pausar a dieta 1 hora antes e 1 hora após a administração do medicamento.
Rifampicina/isoniazida	Cápsula	SIM		20mL	O produto deve ser ingerido pela manhã, em jejum ou duas horas após a refeição, com algum líquido, sem mastigar.	Pode ser triturado. A administração concomitante com a nutrição enteral reduz absorção. Pulverizar e dispersar em 20mL de água.
Risperidona	Comprimido	SIM	++	15mL	Pode ser administrado na presença ou ausência de alimento.	Pode ser triturado, porém dissolve sem trituração.
Saccharomyces Boulard-17	Cápsula	SIM	++	10-20mL	Devem ser engolidas inteiras, sem mastigar, com um pouco de líquido. Para crianças pequenas ou pessoas com dificuldades de deglutição, as cápsulas podem ser abertas, adicionando-se o conteúdo a mamadeiras e a pequenas quantidades de líquidos ou alimentos semissólidos. Não adicionar o produto a líquidos ou alimentos quentes ou gelados, assim como a alcoólicas. Deve ser tomado de preferência em jejum ou meia hora antes das refeições.	Abrir a cápsula para dissolução do medicamento em água. Uma vez abertas as cápsulas, seu conteúdo deve ser imediatamente ingerido, pois o contato com o ar e a umidade altera o prazo de validade do produto.
Salbutamol	Comprimido	SIM	-	15mL	Não são conhecidas interações com alimentos.	Não dissolve sem trituração.



Medicamento/ Dosagem	Forma Farmacêutica	Administração Via Sonda	Resíduo	Volume para diluição	Recomendações para administração oral	Recomendações para administração via sonda nasoenteral
Salbutamol	Frasco 100mL	SIM		15mL de água para cada 10mL de xarope	Não são conhecidas interações com alimentos.	Diluir em 30mL de água.
Sertralina	Comprimido	SIM	+++	20mL	Pode ser administrado pela manhã ou noite, na presença ou ausência de alimentos.	Pode ser triturado. Dissolve lentamente sem trituração. Após diluição administrar imediatamente.
Sildenafil, citrato	Comprimido	SIM	+++	20mL	Não são conhecidas interações com alimentos. Pode ser administrado na presença ou ausência de alimento.	Os comprimidos podem ser triturados e diluídos em água para facilitar administração. Interage com grapefruit.
Sildenafil, citrato	Frasco 50mL	SIM	Viscoso		Não são conhecidas interações com alimentos. Pode ser administrado na presença ou ausência de alimento.	Recomenda-se diluir em água para melhor fluidez.
Simeticona	Comprimido	Sim com restrições	+++	20mL	Não são conhecidas interações com alimentos.	Não dissolve sem trituração. Preferir a solução oral.
Simeticona	Frasco 10mL	SIM	+	20mL	As gotas podem ser administradas diretamente na boca, ou diluídas em um pouco de água ou outro alimento.	
Sinvastatina	Comprimido	SIM	+++	20mL	Recomenda-se que seja administrado em dose única à noite.	Triturar, diluir e administrar imediatamente. A dissolução do comprimido em água pode levar alguns minutos. Irrigar a sonda antes e ao término da administração do medicamento. Monitorar efeitos do medicamento.
Sirolimus	Comprimido	SIM	+++	30mL	A ingestão concomitante de alimentos altera a biodisponibilidade do sirolimo. Assim, deve-se optar pela administração do sirolimus consistentemente com ou sem alimentos para minimizar a variabilidade de nível sanguíneo.	Triturar, diluir e administrar imediatamente.

Medicamento/ Dosagem	Forma Farmacêutica	Administração Via Sonda	Resíduo	Volume para diluuição	Recomendações para administração oral	Recomendações para administração via sonda nasoenteral
Sucralfato	Comprimido	SIM	+++	20mL	Recomenda-se a administração com o estômago vazio, uma hora antes ou duas horas após as refeições ou ao deitar.	Não dissolve sem trituração. Pausar a dieta 1 hora antes e 1 hora depois da administração do medicamento.
Sulfametoxazol- Trimetoprima	Comprimido	SIM	++	20mL	Deve ser administrado preferencialmente após uma refeição, e com quantidade suficiente de líquido.	Pode ser triturado, mas dissolve sem trituração. Há risco de obstrução da sonda. Pausar a dieta e irrigar a sonda antes e ao término da administração do medicamento.
Sulfametoxazol- Trimetoprima	Suspensão oral	SIM	Viscoso	50 a 60mL de água para cada 20mL de suspensão reconstituída	Deve ser administrado preferencialmente após uma refeição.	
Sulfato ferroso	Comprimido revestido	SIM	++	20mL	Deve ser administrado após as refeições, acompanhado de água ou suco de frutas. Não deve ser administrado com leite ou bebidas alcóolicas.	Não dissolve sem trituração. Fármaco instável, fotossensível e oxidável. Considerar a substituição pela solução oral.
Sulfato ferroso	Solução oral Frasco de 30mL	SIM	Viscoso	30mL-50mL	Embora a absorção seja maior quando o estômago está vazio, a administração com as refeições diminui a frequência de efeitos indesejáveis.	Administrar juntamente com a nutrição enteral a fim de reduzir os efeitos gastrintestinais. Diluir em 30-50mL de água.
Tacrolimo	Comprimido	Sim com restrições			As cápsulas devem ser ingeridas com líquido (preferencialmente água) e com estômago vazio ou, pelo menos, 1 hora antes das refeições ou de 2-3 horas após as refeições para conseguir uma máxima absorção do medicamento.	Incompatível com plástico PVC. Tubos, seringas e outros equipamentos para preparação ou administração não devem conter PVC em sua composição. Em caso de pacientes incapazes de deglutir as cápsulas, as cápsulas podem ser abertas e diluídas em água. Recomenda-se o fechamento da sonda por 30-60 minutos após administração.

Medicamento/ Dosagem	Forma Farmacêutica	Administração Via Sonda	Resíduo	Volume para diluição	Recomendações para administração oral	Recomendações para administração via sonda nasoenteral
Tamoxifeno, citrato 	Comprimido	NÃO			Deve ser administrado com água de preferência no mesmo horário todos os dias. Não está documentada interação com alimentos.	Risco ocupacional para o manipulador.
Tiabendazol	Comprimido	SIM	++	20mL	Deve ser ingerido durante as refeições.	Dissolve sem trituração, mas pode ser triturado. Preferir suspensão.
Tiabendazol	Frasco 60mL	SIM		20mL de água para cada 10mL de suspensão.	Deve ser ingerido durante as refeições.	Pode ser administrado juntamente com a nutrição enteral.
Tiamazol	Comprimido	SIM	+	15mL	Pode ser administrado na ausência ou presença de alimentos.	Triturar, diluir e administrar imediatamente. Pode ser administrado juntamente com a nutrição enteral.
Ticagrelor	Comprimido	Dado na literatura não encontrado			Pode ser administrado na ausência ou presença de alimentos.	
Tioguanina 	Comprimido	NÃO			Na presença de alimentos a concentração plasmática pode ser reduzida.	Risco ocupacional para o manipulador.
Topiramato	Comprimido	Sim com restrições	+	15mL	Pode ser administrado na ausência ou presença de alimentos.	Triturar, diluir e administrar imediatamente.
Tramadol, cloridrato	Cápsula	SIM	+++	15mL	Deve ser ingerido com um pouco de líquido.	Abrir a cápsula e dissolver o conteúdo. Irrigar a sonda antes e ao término da administração do medicamento.
Tretinoína 	Comprimido	NÃO			Recomenda-se a administração durante ou logo após as refeições.	Risco ocupacional para o manipulador.
Trimetazidina, dicloridrato	Comprimido revestido de liberação prolongada	NÃO			Deve ser ingerido com água no momento das refeições.	Não há estudos sobre eficácia, segurança e farmacocinética.

Medicamento/ Dosagem	Forma Farmacêutica	Administração Via Sonda	Resíduo	Volume para diluição	Recomendações para administração oral	Recomendações para administração via sonda nasoenteral
Varfarina sódica	Comprimido	SIM	+	15mL	Alimentos contendo vitamina K alteram a eficácia anticoagulante.	Parar a dieta 1 hora antes e 1 hora depois da administração do medicamento. Triturar, diluir e administrar imediatamente. Não dissolve sem trituração.
Verapamil, cloridrato	Comprimido	SIM	++	15mL	Deve ser administrado preferencialmente com a alimentação ou logo após. Devem ser deglutidos com um pouco de água sem serem mastigados ou chupados.	Triturar, diluir e administrar imediatamente. Pode ser triturado, mas dissolve sem trituração.
Vitamina B1	Cápsula	Sim com restrições			Deve ser administrado com água ou um pouco de líquido.	Monitorar possíveis reações adversas no trato gastrointestinal. Parar a dieta e irrigar a sonda antes e ao término da administração do medicamento.
Voriconazol	Comprimido revestido	SIM	+	20mL	A administração com alimentos ricos em gorduras resulta em diminuição da concentração máxima em 34%. Recomenda-se administrar 1 hora antes ou 1 hora após as refeições.	Triturar, diluir e administrar imediatamente. Parar a dieta 1 hora antes e 1 hora depois da administração do medicamento.
Zinco elementar	Frasco 30mL	SIM	-	-	Recomenda-se a administração afastada das refeições.	Administrar sem prévia diluição.

HOSPITAL DE CLÍNICAS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO  
Setor de Farmácia Hospitalar  
Fone: (34) 3318-5247 / 5248 e-mail: farmacia.hctm@ebserh.gov.br