

## Soro Antirrábico

### Soro Heterólogo

- **Dose:** 40UI/Kg, no máximo 3000 UI
- **Administração:** Deve ser aplicado por via intramuscular, na região glútea (quadrante superior externo). Nas crianças com idade menor de 2 anos, deve ser administrado na face lateral da coxa. Não se deve aplicar o soro na mesma região em que foi aplicada a vacina.

### **A ADMINISTRAÇÃO DEVE SER REALIZADA ANTES DA 3ª DOSE DA VACINA**

- **Preparo para administração:** Realizar 30 minutos antes da administração do soro.

Medicamento	Criança	Adulto
<b>Antagonistas dos receptores H1 da histamina</b>		
Dexclorfeniramina ou Prometazina	0,08mg/kg 0,5mg/kg	5mg 50mg
<b>Antagonistas dos receptores H2 da histamina</b>		
Cimetidina ou Ranitidina	10mg/kg 1,5mg/kg	300mg 50mg
Hidrocortisona	10mg/kg	500mg

- **Precaução:** Manter acesso venoso calibroso durante administração. Manter paciente em observação em pronto-socorro no mínimo 2h.

### Imunoglobulina antirrábica humana (IGHAR)

#### - Indicação:

- 1- Hipersensibilidade conhecida ao soro heterólogo
- 2- História de uso prévio de outros heterólogos (origem equina)
- 3- História de contato frequente com animais, principalmente equinos (lazer, veterinários, etc)

- **Dose:** 20UI/kg

- **Administração:** Não é necessário realizar preparo para administração. Deve ser aplicado por via intramuscular, na região glútea (quadrante superior externo). Nas crianças com idade menor de 2 anos, deve ser administrado na face lateral da coxa. Não se deve aplicar o soro na mesma região em que foi aplicada a vacina.

### **A ADMINISTRAÇÃO DEVE SER REALIZADA ANTES DA 3ª DOSE DA VACINA**

