



UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO

HOSPITAL ESCOLA

COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

SITUAÇÕES EM QUE O USO DE VANCOMICINA DEVE SER DESESTIMULADO – EVITADO

- 1) Profilaxia cirúrgica de rotina, em situações não previstas anteriormente.
- 2) Terapêutica inicial do paciente neutropênico febril, a não ser que haja evidência sugestiva de infecção estafilocócica e elevada ocorrência de MRSA na instituição.
- 3) Tratamento de isolado único de *S. epidermidis* (Scn) em hemocultura (provável contaminação).
- 4) Uso empírico continuado em pacientes em que não se confirmam as evidências de estafilococos resistentes.
- 5) Descontaminação seletiva do trato gastrointestinal.
- 6) Descolonização e erradicação de MRSA.
- 7) Profilaxia de rotina do recém-nascido de baixo peso (<1,5 kg).
- 8) Profilaxia de diálise peritoneal ou hemodiálise.
- 9) Tratamento de infecções por bactérias Gram positivas sensíveis aos beta-lactâmicos apenas por conveniência das doses.
- 10) Uso tópico, em irrigação ou em solução.
- 11) Tratamento de colite associada ao uso de antimicrobianos (exceto quando houver resistência ao metronidazol).