

**EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS**

PORTARIA N. 40, de 24 de maio de 2019 .

O GERENTE INTERINO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas Portaria nº 95/2019, de 22 de março de 2019, publicada no Boletim de Serviço do HU-UFGD/EBSERH nº 183 de 28 de março de 2019.

RESOLVE:

- I. Aprovar o Procedimento Operacional Padrão (POP) – Administrativo, referente a Higienização de mamadeiras, do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados – Filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, parte integrante desta portaria.
- II. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ANGELO OSELAME HOFFMANN

Procedimento Operacional Padrão (POP) – ADMINISTRATIVO	POP nº. 07/UNC
Higienização de Mamadeiras	Versão: 1.0
Unidade organizacional: Unidade de Nutrição Clínica/ Lactário - Central de Terapia Nutricional	
Elaborado por: Érika Leite Ferraz Libório, Cristhiane Rossi Gemelli, Josiane Ribeiro dos Santos Santana, Viviane Castilho Justo.	Data de Criação: 21/12/2017.
Revisado por: Renata Martins Castro Rosa.	Data de Revisão: 16/01/2018.
Aprovado por: Gerência de Atenção à Saúde do HU-UFGD	Data de Aprovação: 24/05/2019.
Responsável pelo POP: Érika Leite Ferraz Libório	

OBJETIVO: Remover as sujidades, evitar a proliferação de bactérias e manter a segurança do alimento preparado.

SIGLAS E ABREVIATURAS: Não se aplica.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: Galego, D.S. et al. Manual de Lactários: Lactário nos estabelecimentos assistenciais de saúde e creches. São Paulo (SP): International Life Sciences Institute do Brasil, 2017.

DEFINIÇÕES: A higienização é a operação que engloba limpeza e desinfecção.

RESPONSABILIDADES: Copeiras do lactário – Central de Terapia nutricional da área externa realizam todas as etapas do procedimento.

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:

1. Preparar uma solução de água e detergente neutro em um recipiente;
2. Primeiro enxaguar as mamadeiras em água corrente para retirar o excesso de sujidades, depois disso deixar de molho as mamadeiras desmontadas, por alguns minutos, até que as sujidades se desprendam da mamadeira;
3. Retirar as sujidades das partes internas e externas utilizando a escova de lavar mamadeira;
4. Os bicos devem ser virados do avesso e com o auxílio de uma escova própria, retirar as sujidades;
5. Enxaguar todas as partes da mamadeira e o bico com água corrente;
6. Em um recipiente leitoso, imergir as mamadeiras em solução de hipoclorito a 0,02% (4,960L de água + 40 ml de hipoclorito a 2,5%) durante 30 minutos e enxaguar em água corrente, registrar em formulário próprio o horário do início e do fim da esterilização;
7. Trocar o hipoclorito do recipiente leitoso no início de cada plantão e o recipiente deve ser mantido fechado e identificado com etiquetas específicas (responsável, data e horário da troca do hipoclorito) e anotado na planilha de Controle da troca de hipoclorito;
8. Colocar para secar em local apropriado virados para baixo;
9. Preencher corretamente o impresso referente ao procedimento;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Impresso de Controle da Troca de Hipoclorito; Etiqueta para solução de hipoclorito; Controle de Esterilização de Mamadeiras.