

## **EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS**

### **PORTARIA N. 76, de 28 de maio de 2019 .**

O GERENTE INTERINO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas Portaria nº 95/2019, de 22 de março de 2019, publicada no Boletim de Serviço do HU-UFGD/EBSERH nº 183 de 28 de março de 2019.

#### **RESOLVE:**

- I. Aprovar o Procedimento Operacional Padrão (POP) – Assistencial, referente a Intercorrência na Hemodiálise: Náuseas e Vômito, do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados – Filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, parte integrante desta portaria.
- II. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**JOÃO ANGELO OSELAME HOFFMANN**

<b>Procedimento Operacional Padrão (POP) – ASSISTENCIAL</b>	<b>POP nº. 15/USU</b>
<b>INTERCORRENCIA NA HEMODIÁLISE: NÁUSEA E VÔMITOS</b>	Versão: 02
<b>Unidade organizacional:</b> Sistema Urinário	
<b>Categoria profissional:</b> Enfermeiro e Técnico de Enfermagem	
<b>Linha de cuidado:</b> Adulto	
<b>Elaborado por:</b> Giselia Paula De Araujo Raimundo	<b>Data de Criação:</b> 20/02/2016
<b>Revisado por:</b> Priscyla Tainan Camargo	<b>Data de Revisão:</b> 20/07/2018
<b>Aprovado por:</b> Gerência de Atenção à Saúde	<b>Data de Aprovação:</b> 28/05/2019
<b>Responsável pelo POP:</b> Diego do Amaral Polido	

**OBJETIVO:** Assistência de Enfermagem em pacientes apresentando náuseas e vômito durante a hemodiálise.

**SIGLAS E ABREVIATURAS:** SF0,9% - Soro Fisiológico, CPM – conforme prescrição medica, EPI- Equipamento de Proteção Individual.

**DEFINIÇÃO:** Náuseas e vômitos são ocorrências comuns e ocorrem em até 10% dos tratamentos rotineiros de diálise, sendo sua etiologia multifatorial. A maioria dos episódios em pacientes estáveis provavelmente esteja relacionada à hipotensão, mas também podem ser uma manifestação precoce da síndrome do desequilíbrio.

**RESPONSÁVEL PELA PRESCRIÇÃO:** Médico

**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** Enfermeiro e Técnico de Enfermagem

**INDICAÇÃO:** Paciente que apresentar náuseas e vômitos

**CONTRAINDICAÇÃO:** Paciente apresentando outra complicação

**MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:**

- EPI;
- Antiemético

**PROCEDIMENTOS:**

- Reduzir o fluxo da bomba;
- Infundir SF0,9% caso o paciente esteja apresentando hipotensão;
- Administrar antiemético cpm;
- Interromper a hemodiálise caso o paciente não melhore.

**RESULTADOS ESPERADOS:** Manter a ação preventiva de náuseas e vômitos, melhora nos sintomas do paciente.

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA:**

- Dalgirdas JT. Manual de diálise. 3ª. Ed. Rio de Janeiro (RJ): Medsi; 2003.
- Barros E, Manfro RC, Thomé FS, Gonçalves LFS. Nefrologia, rotinas, diagnóstico e tratamento. 2ª. ed. Porto Alegre (RS): Artmed; 1999.
- Reis EMK, Silva TS. Eventos mórbidos intradialíticos em nefropatas diabéticos e não diabéticos: caracterização e condutas. J Bras Nefro 2003; 25 (Supl 1): 7; HD ENF 18.