

HULW/EBSERH – SETOR DE FARMÁCIA HOSPITALAR
UNIDADE DE FARMÁCIA CLÍNICA

TABELA DE DILUIÇÃO
MEDICAMENTOS LÍQUIDOS ORAIS ADMINISTRADOS POR SONDA

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO	VOLUME DE ÁGUA P/DILUIR (ML)	OBSERVAÇÃO
Ac.ascórbico 200mg/ml	Gotas	10ml de água p/5gotas	Para pacientes com restrição hídrica consultar o médico
Ac.valpróico/valproato de sódio xarope	250mg/5ml	50ml de água	idem
Albendazol suspensão	4%	15ml	Idem
Ambroxol xarope	50mg/ml	30ml de água/10ml de xarope	Idem
Azitromicina suspensão	200mg/5ml	30 a 50 ml de água p/10ml da suspensão	Idem Pausar dieta 1 hora antes e 1 hora após a administração
Bromoprida gotas	4mg/ml	10ml de água para cada 30 gotas	Para pacientes com restrição hídrica consultar o médico
Buscopam gotas	10mg/ml	15ml	idem
Carbamazepina sol oral	2%	50ml de água p/5ml de solução	Idem
Cefalexina suspensão	250mg/5ml	20 a 50ml de água/10ml de suspensão	Idem Pausar dieta 1 hora antes e 1 hora após a administração
Clonazepam gotas	2,5mg/ml	15ml de água p/40gotas	Para pacientes com restrição hídrica consultar o médico
Cloreto de potássio xarope	900mg/15ml	1ml de água p/1ml de xarope	idem

Complexo B gotas	Gotas	20ml	Idem
Dexclorfeniramina	Sol oral	20ml de água /5ml de sol oral	Idem
Digoxina elixir	0,05mg/ml	1ml de água para cada 1ml de elixir	idem
Domperidona suspensão	1m/ml	10ml de água/10ml de suspensão	Idem
Fenobarbital gotas	4%	20-30ml de água	Idem
Hidróxido de alumínio	Suspensão	20ml de água / 10ml de suspensão	Idem
Lactulose	Xarope	20ml de água	Para pacientes com restrição hídrica consultar o médico
Mebendazol suspensão	20mg/ml	15ml de água	Idem
Metronidazol susp.	40mg/ml	20ml de água para cada 10ml de suspensão	idem
Midazolam solução	2mg/ml	10ml de água para cada 10 gotas	idem
Ranitidina xarope	15mg/ml	20 ml de água/10ml de xarope	Para pacientes com restrição hídrica consultar o médico
Rifampicina suspensão	300mg	20 ml de água /10ml de suspensão	Idem Pausar dieta 1 hora antes e 1 hora após a administração
Simeticona gotas	75mg/ml	20ml de água	Para pacientes com restrição hídrica consultar o médico
Trimetropina/sulfametoxazol	Suspensão	50 a 60 ml de água/20ml de suspensão	idem

Referência: retirado do “Manual para Administração de Medicamentos por Acessos Enterais”, elaborado pela EMT do Hospital Sírio-Libanês/IEP