

Tratamento da infecção latente da tuberculose: É recomendado que todo tratamento da ILTB seja notificado, e é importante que haja a exclusão da tuberculose ativa previamente

Dados Gerais	1 UF <b>M   G</b>	2 Município de Notificação <b>JUIZ DE FORA</b>	Código (IBGE) <b>3   1   3   6   7   0</b>		
	3 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora)	Código CNES	4 Data da Notificação		
Notificação Individual	5 Nome do Paciente		6 Data de Nascimento		
	7 (ou) Idade 1 - Hora 2 - Dia 3 - Mês 4 - Ano	8 Sexo M - Masculino F - Feminino I - Ignorado	9 Raça/Cor 1-Branca 2-Preta 3-Amarela 4-Parda 5-Indígena 9- Ignorado	10 Escolaridade 0- Nenhuma 1- de 1 a 3 anos 2- de 4 a 7 anos 3- de 8 a 11 anos 4- 12 anos ou mais 9- Ignorado	
	11 Ocupação (Trabalho e Renda) (a definir)				
	12 Nome da mãe		13 Cartão Nacional		
Dados de Residência	14 UF	15 Município de Residência	Código (IBGE)	16 Distrito	
	17 Bairro	18 Tipo de Logradouro (rua, avenida,...)	19 Logradouro		
	20 Número	21 Complemento (apto., casa, ...)	22 Ponto de Referência		
	23 (DDD) Telefone		24 (DDD) Celular	25 País (se residente fora do Brasil)	

**Investigação**

Antecedentes Epidemiológicos	26 Nº do Prontuário	27 BCG 1 - Sim, até 2 anos de idade 2 - Sim, após dos 2 anos de idade 3-Não 4-Ignorado	
	28 Contato de TB 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	29 Nome do contato	30 Nº do Sinan
Dados Clínicos	31 Radiografia de tórax 1 - Normal 2 - Alteração não sugestiva de TB 3- Não Realizada		
	32 Última Prova Tuberculínica mm	33 Data	34 Conversão Tuberculínica Recente 1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado

Tratamento	35 Indicação do Tratamento da ILTB	
	<p><b>Sem PT realizada</b></p> <p>1-RN coabitante de caso índice bacilífero 2-Pessoa vivendo com HIV/ Aids com cicatriz radiológica sem tratamento prévio 3- Pessoa vivendo com HIV/ Aids contato de TB pulmonar</p> <p><b>PT &gt;5mm</b></p> <p>4-Contatos crianças menores de 10 anos, não vacinadas com BCG 5-Contatos crianças menores de 10 anos, vacinadas com BCG até 2 anos de idade 6-Contatos adultos e adolescentes maiores de dez anos 7-Pessoas vivendo com HIV/ Aids 8-Indivíduos em uso de inibidores do TNF-a 9-Alterações radiológicas fibróticas sugestivas de seqüela de TB não tratada 10-Transplantados em terapia imunossupressora 11-Indivíduos menores de 65 anos em uso de corticosteroides (&gt;15mg de predisona por mais de 1 mês)</p> <p>26-Outras</p>	<p><b>PT &gt;10mm</b></p> <p>12-Contatos crianças menores de 10 anos, vacinadas com BCG após 2 anos de idade 13-Silicose 14-Neoplasia de cabeça e pescoço 15-Neoplasias hematológicas 16-Insuficiência renal em diálise 17-Indivíduos menores de 65 anos com diabetes mellitus 18-Indivíduos menores de 50 anos com baixo peso (&lt;85% do peso ideal) 19-Indivíduos menores de 50 anos tabagistas (&gt;1 maço/ dia) 20-Indivíduos menores de 50 anos com calcificação isolada (sem fibrose) na radiografia</p> <p><b>Conversão tuberculínica</b></p> <p>21-Indivíduos contatos de TB bacilífera 22-Profissional de saúde 23-Profissional de laboratório de micobactéria 24-Trabalhador do sistema prisional 25-Trabalhadores de instituições de longa permanência</p>
	36 Drogas <input type="checkbox"/> Isoniazida <input type="checkbox"/> Outra (s)	37 Data de Início do Tratamento Atual

Investigador	Município/Unidade de Saúde		Cód. da Unid. de Saúde
	Nome	Função	Assinatura